



Untersuchungsvorbereitung Myocardszintigraphie

Frühstück	Nüchtern
Getränke	Nur Wasser
Medikamente	Am besten am Untersuchungstag und am Vorabend gar keine einnehmen
	Falls dies nicht möglich ist: Herzkreislaufmedikamente sollen am Untersuchungstag NICHT eingenommen, aber zur Untersuchung mitgenommen werden. Sie können und sollen diese Medikamente nach der Belastung einnehmen.
Theophyllin Präparate	Müssen mindestens 72 Stunden vor der Untersuchung pausiert werden. <u>z.B.:</u> Theospirex, Unifyl, Euphyllin, Respicur, ...
Beta Blocker und Calcium Antagonisten	Müssen mindestens 12 Stunden vor Persantin pausiert werden <u>z.B.:</u> Atenolol, Beloc, Bisoprolol, Bisostad, Concor, Metohexal, Metoprolol, Selectol, Seloken, Tenormin, Nomexor, ... <u>z.B.:</u> Diltiazem, Dilzem, Isoptin, Procorum, Verapabene, Verapamil, Verapastard, Norvasc, Amlodipin
Untersuchungsablauf	Zuerst wird die Herzdurchblutung nach Belastung (medikamentös) untersucht. Sollte dieser Befund nicht ganz unauff. sein, erfolgt eine weitere Untersuchung nach einer zwei- bis dreistündigen Ruhephase. Anschließend werden die Untersuchungsergebnisse ausgewertet und ein Befund für ihren Zuweiser verfasst.